



Eficacia ante todo.

# DERMOHIT®

## 250 mg – 500 mg

### Sólido-TABLETAS

**Griseofulvina micronizada como: Antimicótico-fungistático para uso en perros y gatos**

### COMPOSICIÓN:

Cada 1 tableta de DERMOHIT® 250, contiene:

Griseofulvina..... 250 mg  
Excipientes c.s.p..... 1 Tableta

Cada 1 tableta de DERMOHIT® 500, contiene:

Griseofulvina..... 500 mg  
Excipientes c.s.p..... 1 Tableta

### DESCRIPCIÓN:

**DERMOHIT®** Es *Griseofulvina micronizada* para uso en perros y gatos en el tratamiento de infecciones fúngicas dermatofíticas (tiñas), enfermedades fácilmente transmisibles a los humanos. Ayuda en la eliminación de los síntomas de prurito, enrojecimiento, descamación e infecciones interdigitales y de los pulpejos.

### INDICACIONES:

**DERMOHIT®** Para el tratamiento de infecciones causadas por hongos de la piel, pelaje, uñas y anexos cutáneos, especialmente contra dermatofitosis (tiñas) que son causadas por las siguientes cepas del género de hongos: *Trichophyton* spp., *T. mentagrophytes*, *Microsporum* spp., *M. canis*, *M. gypseum* (onicomicosis) y *Epidermophyton floccosum*.

### MECANISMO DE ACCIÓN:

Interfiere en la síntesis de las proteínas y los ácidos nucleicos de la pared celular de los hongos; inhibe la división celular fúngica en metafase y se une a la queratina manteniendo la resistencia contra los hongos. Rompe el huso mitótico al interactuar con los microtúbulos polimerizados.



## Eficacia ante todo.

Se une a células precursoras de la queratina del pelo, piel y uñas de células infectadas lo que permite que el fármaco altere las células micóticas ya presentes y genere un medio desfavorable para el crecimiento del hongo.

Además de sus propiedades antimicóticas, ha demostrado ser antiinflamatorio y antiquimiotáctico para leucocitos polimorfonucleares.

**DERMOHIT®** *Se conjuga muy bien con la queratina nueva, adquiriendo gran resistencia a las nuevas invasiones fungales.*

### **ESPECIE DE ANIMALES A LAS QUE SE DESTINA:**

Perros y gatos.

### **FORMA DE ADMINISTRACIÓN:**

Administrar preferiblemente con **AMIGO® SNACK**, **LINDOPEL® Emulsión** o **LINDOPEL® POLVO**, o una comida alta en grasas para aumentar su absorción. No suministrar con el estómago vacío para prevenir gastritis por lo prolongado del tratamiento.

Se recomienda terapia tópica concomitante con **FUNHIT®** Loción o **FUNHIT® EMULGEL**.

### **DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:**

Suministrar vía oral, según la especie a tratar:

- Suministrar entre 25 a 50 mg/kg de peso vivo. En la práctica:
  - Media (1/2) tableta por cada 1 – 5 kg de peso vivo (**Dermohit® 250**).
  - Una (1) tableta por cada 5 – 10 kg de peso vivo (**Dermohit® 250**).
  - Una (1) tableta por cada 11 a 20 kg de peso vivo (**Dermohit® 500**).

Dividir la dosis total en 2 tomas al día, durante un periodo no menor a 4 a 6 semanas; para onicomicosis el tratamiento debe realizarse por 6 – 12 meses. En todos los casos continuar la terapia durante 2 semanas luego de alcanzada la cura clínica.

- En gatos para combatir *M. canis* después de rasurar, suministrar entre 80 a 130 mg/kg bucal, 1 vez por día con una comida grasosa.



Eficacia ante todo.

**CONTRAINDICACIONES:**

- No utilizar en animales con conocida hipersensibilidad a la griseofulvina.
- No administrar en animales en gestación ni durante la lactación.
- No utilizar en animales con insuficiencia hepatocelular.
- No utilizar en gatos con el virus de la inmunodeficiencia felina o leucemia felina.
- No utilizar en machos reproductores.

**EFFECTOS ADVERSOS:**

Leves trastornos digestivos. Los efectos adversos más importantes asociados a la griseofulvina se producen en gatos; se incluye leucopenia, anemia, incremento de la actividad de enzimas hepáticas y neurotoxicosis (Helton et al., 1986). La toxicidad de la griseofulvina puede ser debida a idiosincrasia (Kunkle y Meyer, 1987) como lo sugiere el hecho de que el tratamiento prolongado en 8 gatos con dosis más alta no produjo los efectos clínicos, hematológicos o hepáticos indeseables.

Para evitar la aparición de vómitos, se recomienda la administración de la dosis dividida en dos tomas diarias.

**PRECAUCIONES:**

**“MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS”**

- Venta bajo fórmula del Médico Veterinario.
- Consérvese en un lugar fresco y seco, protegido de la luz a una temperatura inferior a los 30°C.
- Uso Veterinario.
- No administrar en animales con enfermedad hepática o en gatos con el virus de la inmunodeficiencia felina o leucemia felina.
- No administrar conjuntamente con fenilbutazona, anticoagulantes o barbitúricos.

**PRESENTACION:**

- **Dermohit® 250:** Caja conteniendo 2 blíster por 10 tabletas cada uno.

LICENCIA DE VENTA:  
Reg. I.C.A. N° 9262 - MV

- **Dermohit® 500:** Caja conteniendo 2 blíster por 10 tabletas cada uno.

LICENCIA DE VENTA:  
Reg. I.C.A. N° 9263 - MV